



ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ



ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ



លេខ ០០២១ សណន. កសក

សេចក្តីណែនាំ
ស្តីពី

វិធានការទប់ស្កាត់ការរាតត្បាតជំងឺជ្រុះស្លឹក Pestalotiopsis និងព្យាបាលជំងឺនេះ
ដល់គ្រប់បណ្តាចម្ការកៅស៊ូ នៅទូទាំងប្រទេស



ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ សូមជម្រាបដល់គ្រប់ប្រតិបត្តិករកៅស៊ូទាំងអស់ អាជ្ញាធរដែនដីគ្រប់
លំដាប់ថ្នាក់ និងអ្នកដាំដុះឱ្យបានជ្រាបថា ថ្មីៗនេះមានករណីផ្ទះជំងឺជ្រុះស្លឹក Pestalotiopsis នៅតំបន់ចម្ការកៅស៊ូ ក្នុង
ក្រុមហ៊ុន កោះកុង រ៉ាប់រើរ ឆ្នេរសិរីសោភ័ណ ដែលមានមូលដ្ឋានស្ថិតនៅឃុំអណ្តូងទឹក ស្រុកបូទុមសាគរ ខេត្តកោះកុង។ ជំងឺ
ជ្រុះស្លឹក Pestalotiopsis ដែលបង្កឡើងដោយផ្សិតឈ្មោះ Pestalotiopsis sp. គឺជាប្រភេទជំងឺដឹកាចសាហាវ និង
រាតត្បាតលឿនបំផុតនៅលើចម្ការកៅស៊ូមានស្លឹកចាស់ៗ ជាពិសេសចម្ការកៅស៊ូកំពុងប្រមូលផល ដែលបណ្តាលឱ្យ
ដំណាំកៅស៊ូជ្រុះស្លឹកអស់ពី ៧០-៩០% និងបាត់បង់ទិន្នផលប្រមាណពី ២៥-៥០%។ នៅក្នុងឆ្នាំ២០១៦ សមាគមបណ្តា
ប្រទេសផលិតកៅស៊ូធម្មជាតិ (ANRPC) បានប្រកាសអាសន្នអំពីប្រភពនៃការរាតត្បាតជំងឺនេះ នៅកោះស៊ីម៉ាត្រា ប្រទេស
ឥណ្ឌូនេស៊ី ហើយរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ន ជំងឺនេះបានរីករាលដាលជាបន្តបន្ទាប់ដល់ប្រទេសកៅស៊ូចំនួន៥ទៀតគឺ៖
ប្រទេសម៉ាឡេស៊ី ថៃ ឥណ្ឌា ស្រីលង្កា និងវៀតណាមភាគខាងជើង។

ដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺជ្រុះស្លឹក Pestalotiopsis ពីតំបន់ចម្ការកៅស៊ូមួយទៅតំបន់ចម្ការកៅស៊ូ
មួយនៅទូទាំងប្រទេសឱ្យបានទាន់ពេលវេលា និងមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទសូម
ធ្វើការណែនាំដល់គ្រប់ប្រតិបត្តិករកៅស៊ូទាំងអស់ អាជ្ញាធរដែនដីគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ និងអ្នកដាំដុះត្រូវចូលរួមសហការ
និងចាត់វិធានការទប់ស្កាត់ដូចខាងក្រោម៖

១. ផ្អាកជាបណ្តោះអាសន្នរាល់ការធ្វើចរាចររុក្ខសម្ភារកៅស៊ូ ចេញពីតំបន់ដែលកំពុងរងការរាតត្បាតពីជំងឺជ្រុះស្លឹក
Pestalotiopsis (ខេត្តកោះកុង) ទៅកាន់តំបន់ផ្សេងៗទៀត។
២. ពង្រឹងការត្រួតពិនិត្យ និងអនុវត្តវិធានការរុក្ខតាមអនាម័យឱ្យបានត្រឹមត្រូវ ចំពោះការនាំចូល និងចរាចរ
រុក្ខសម្ភារកៅស៊ូពីបណ្តាប្រទេសជិតខាង សម្រាប់បម្រើការដាំដុះនៅទូទាំងប្រទេស និងត្រូវបង្កើតច្បារពូជ
ថ្នាលបណ្តុះកូនកៅស៊ូ ឬទិញរុក្ខសម្ភារកៅស៊ូដែលផលិតនៅក្នុងស្រុក។
៣. រាយការណ៍ជាបន្ទាន់មកអគ្គនាយកដ្ឋានកៅស៊ូ ដើម្បីមានវិធានការទប់ស្កាត់បានទាន់ពេលវេលា ក្នុងករណី
សង្កេតឃើញថាចម្ការកៅស៊ូមានការរាតត្បាតជំងឺ ឬជ្រុះស្លឹកមិនប្រក្រតី។
៤. ក្នុងករណីរកឃើញថាមានកើតជំងឺជ្រុះស្លឹក Pestalotiopsis នៅលើចម្ការកៅស៊ូ ម្ចាស់ចម្ការត្រូវអនុវត្តវិធីសាស្ត្រ
ព្យាបាលដូចខាងក្រោម៖
 - ត្រូវប្រើថ្នាំសម្លាប់ផ្សិតប្រភេទឌីតាន M45 (បរិមាណ១គ.ក្រលាយទឹក១០០លីត្របាញ់ ៤ដង/ខែ)
 - ត្រូវដាក់ជីបំប៉ន (NPK ១៥-១៥-១៥ ចំនួន៣ដង/ឆ្នាំ ចាប់ពីខែឧសភាដល់ខែតុលា)

- ត្រូវប្រមូលស្លឹកដែលជ្រុះដុតចោល និងសម្អាតតាមចន្លោះរងកៅស៊ូឱ្យបានស្អាត
- ត្រូវហាមឃាត់អ្នកពាក់ព័ន្ធក្នុងចម្ការកៅស៊ូ និងប្រជាពលរដ្ឋជុំវិញកុំឱ្យចេញ-ចូលក្នុងតំបន់រាតត្បាតជំងឺ ដែលអាចជាប្រភពចម្លងទៅតំបន់ដទៃទៀត។

ទទួលបានសេចក្តីណែនាំនេះ សូម ប្រតិបត្តិការកៅស៊ូទាំងអស់ អាជ្ញាធរដែនដីគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ និងអ្នកដាំដុះ ទូទាំងប្រទេស ត្រូវចូលរួមសហការអនុវត្តឱ្យមានប្រសិទ្ធភាព និងប្រកបដោយស្មារតីទទួលខុសត្រូវខ្ពស់។

ថ្ងៃអង្គារ ៧ ខែ មេសា ឆ្នាំឆ្លូវ ត្រីស័ក ព.ស.២៥៦៥
 រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ០៧ ខែ មេសា ឆ្នាំ២០២២
 រដ្ឋមន្ត្រី

ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ



វេជ្ជ សាខុន

Handwritten marks and initials at the bottom right corner.